HTA

ce que doit savoir un DES de cardio

Pr Xavier Girerd

Fondation de Recherche sur l'Hypertension Artérielle

*Unité de Prévention des Maladies Cardiovasculaires
Groupe Hospitalier Universitaire Pitié-Salpêtrière*

Sorbonne Université

Paris, France

Paris, 16 février 2023

Ce que doit savoir un DES de cardio

- **Savoir que l'HTA en France est une maladie imparfaitement prise en charge**
- **Savoir utiliser les tensiomètres automatiques**
- **Connaître les médicaments antihypertenseurs**
- **Connaître les recommandations récentes**
- **Savoir prendre en charge l'HTA sévère**
- **Savoir choisir le bilan radiologique chez un hypertendu suspect d'une cause secondaire**
- **Que faire avec ces patients : histoires cliniques**

Savoir que l'HTA en
France est une maladie
imparfaitement prise en
charge

Hypertension et facteurs de risque cardio vasculaires dans la population des 35 ans et plus entre 2007 et 2019 en France métropolitaine

	2007		2012		2017		2019	
HTA	32%		30%		28%		28%	
	33,6%	30,4%	31,5%	28,5%	29,3%	26,7%	28,6%	26,6%
DYSLIPIDEMIE	22%		22%		17%		17%	
	23,4%	20,6%	23,4%	20,6%	18,1%	15,9%	17,4%	15,8%
DIABETE	8%		8%		9%		9%	
	8,9%	7,1%	8,9%	7,1%	9,8%	8,2%	9,2%	8,0%
TABAC	19%		20%		16%		15%	
	20,4%	17,6%	20,8%	18,2%	17,2%	15,2%	16,0%	14,4%
OBESITE	17%		18%		18%		19%	
	18,3%	15,7%	19,0%	16,4%	19,5%	17,3%	19,4%	17,6%

moyenne [IC 95%]

Population France métropolitaine 35 ans et + : 33.6 M en 2007; 37.1 M en 2019

Prévalence de l'hypertension après réalisation
d'un dépistage (3 mesures) ou d'une automesure (18 mesures)
selon l'âge dans la population générale
si l'hypertension est au seuil de 135/85

827 sujets ayant réalisé une automesure avec 18 mesures selon le protocole **suiviHTA**

Stratégie d'usage des anti-hypertenseurs 2007 - 2012 - 2014 - 2017 - 2019 - 2020

Ordonnances des sujets traités

Enquête FLAHS French League Against Hypertension Survey - Population des hypertendus traités de 35 ans et plus

**Savoir utiliser les
tensiomètres
automatiques**

Céphalées, acouphènes, pseudo-vertiges, épistaxis, chaleur visage, poussée de tension (Tension non contrôlée)

La mesure répétée de la pression artérielle avec un tensiomètre automatique est recommandée pour le diagnostic et le suivi des hypertendus au cabinet médical et en ambulatoire

Mesure répétée
de consultation
(MRC)
3 mesures avec
moyenne des 2 dernières

Automesure
tensionnelle
(AMT)
3 mesures matin/soir,
3 jours consécutifs

Mesure Ambulatoire
de la Pression Artérielle
(MAPA)
4/heure période éveil
2/heure période sommeil

Achat d'un tensiomètre www.depistHTA.net

**OFFRE SPÉCIALE depistHTA en partenariat avec la
Fondation de Recherche sur l'HTA**

Tensiomètre électronique
Omron M3 Comfort

43,90 €

Tensiomètre électronique
Spengler Tensonic®

33,90 €

depistHTA

* Holtex partenaire de l'opération, distributeur des marques OMRON et SPENGLER auprès des revendeurs de matériel médical.

La mesure répétée en consultation (Automated Office BP) est comparable à la moyenne de la MAPA (période d'activité)

Tensiomètre WELCH ALLYN PRO BP2400

Mesure 1 déclenchée par le professionnel de santé
Mesure 2 et 3 sans intervention du professionnel de santé (moyenne)
2 minutes entre début de chaque mesure

Le brassard adapté

En consultation à Paris chez l'adulte : périmètre du bras est en moyenne à 33 cm
100% des patients < 42 cm
90% des patients < 36 cm
0% < 26 cm

BRAS

Sur le bras avec un vêtement d'une seule épaisseur (chemise)

Sur le bras nu avec la manche relevée

POIGNET

Bras croisés à la hauteur du coeur

PROTOCOLE

RESTER ASSIS ET AU REPOS

NE PAS FUMER

NE PAS PARLER

Nouveautés dans la connectique

← **PROTOCOLE**

1 2 3 4

Obtenir la mesure de tension en prenant une photo, comme l'indique l'animation

depist HTA

SYS 116 SYS

DIA 94 DIA

PUL 88 PUL

START STOP

FERMER

← Prenez une photo de l'écran de l'appareil.

iHealth

23:48 11-18

131

86

79

mmHg

PULSE / min

▶ Evitez les reflets sur l'écran du tensiomètre

▶ Evitez les ombres sur les chiffres

▶ L'éclairage de la pièce doit être suffisant

VALIDER LES DONNÉES

←

iHealth

23:49 11-18

131

86

79

mmHg

PULSE / min

SYS 131 DIA 86

VALIDER LES DONNÉES

Si erreur de lecture

SAISIR LES VALEURS

L'hypertension artérielle est suspectée à la consultation et confirmée en « ambulatoire » *MAPA ou automesure*

HTA suspectée

$\geq 140/90$ en consultation

≥ 150 (80 ans et plus)

HTA confirmée

Eveil

$\geq 135/85$

≥ 145 (80 ans et plus)

Sommeil

$\geq 120/70$

Mesurer et interpréter sa tension*

SUIVI HTA *nouvelle version !*

Mesurez votre tension quand ça vous plaît !

RÉALISEZ

L'AUTOTEST DE LA TENSION

- Au moins une fois par an à partir de 30 ans
- Pour connaître votre risque de maladie cardiovasculaire

Mesurez votre tension selon les recommandations de votre médecin

RÉALISEZ

L'AUTOMESURE SUR 3 JOURS

3 mesures le matin, 3 mesures le soir pendant 3 jours de suite

L'appli gratuite qui facilite la vie du médecin et du patient

* selon la Haute Autorité de Santé et l'Assurance Maladie

Automesure sur 3 jours : tableau des tensions

L'application **suiviHTA** vous guide pas à pas pour bien utiliser votre tensiomètre automatique. Vous pouvez d'abord inscrire les chiffres sur le tableau ci-dessous puis les reportez plus tard dans l'appli !

- 3 mesures de suite sans changer de bras
- 1 minute entre chaque mesure
- Pendant les mesures :
 - assis, ne pas croiser les jambes
 - ne pas fumer 30 minutes avant et pendant

Prenez-vous des médicaments contre l'hypertension ?

Non Oui

	Nom	Dosage
Médicament 1 :		
Médicament 2 :		
Médicament 3 :		
Médicament 4 :		

	JOUR 1 : le/...../.....	JOUR 2 : le/...../.....	JOUR 3 : le/...../.....	MOYENNE DU RELEVÉ	
	MATIN			tensions SYS	□ □ □ □
	mesure 1	mesure 2	mesure 3	tensions DIA	□ □ □ □
SYS	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	tension élevée si	SYS à plus de 135 OU DIA à plus de 85
DIA	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	tension satisfaisante si	SYS de 100 à 130 ET DIA de 80 à 85
	SOIR			tension basse si	SYS à moins de 100 OU DIA à moins de 80
	mesure 1	mesure 2	mesure 3		
SYS	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □		
DIA	□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □		

Pour apprendre sur l'HTA : www.frhta.org

LA TENSION EN VIDÉOS

Hypertension France

[Abonnez-vous à la chaîne Youtube de l'hypertension](#)

[Les normes pour définir l'hypertension devraient-elles être « genrées » ?](#) – Dr M-C Wimart

[Une « tension blouse blanche » concerne 55% des sujets âgés de 70 ans et plus et 50% des 35-64 ans](#) – Tension en chiffres, Pr X Girerd

[Attention à l'effet blouse blanche même en téléconsultation](#) – Dr M-C Wimart

[Hypotension : conseils aux patients – Le plan Prévention de chutes en France](#) – Pr Olivier Hanon

[Fréquence et facteurs de risques des chutes graves chez les hypertendus](#) – Dr M-C Wimart

[L'hypotension concerne 7% des adultes et 3% des sujets traités par antihypertenseurs](#) – Pr Xavier Girerd

[Tension basse : qu'en penser ?](#) – Pr Xavier Girerd

[Comment suivre le régime DASH ?](#) – Dr Sébastien Rubin

[Quel régime suivre pour l'hypertendu ?](#) – Le conseil du Pr Xavier Girerd

[Suivre une alimentation de type DASH préserve de la mort](#) – Dr M-C Wimart

Connaître les médicaments antihypertenseurs

Prévention des complications de l'HTA selon la classe pharmacologique par comparaison au Placebo

Complication	Antihypertenseur
AVC	Diurétique Beta bloquant Antagoniste calcique IEC AA2
Insuffisance cardiaque	Diurétique Beta bloquant IEC AA2

Usage des anti-hypertenseurs en 2019

Utilisation des IEC

Enquête FLAHS 2019- French League Against Hypertension Survey
3171 médicaments antihypertenseurs
2108 traités par antihypertenseurs
Base de 576 patients traités par IEC

Comparaison du risque d'angioedeme

Risque 3 fois plus élevé avec IEC vs AA2

Incidence du total des angioedemes pour 1000 patients/année
4.38 (95% CI, 4.24-4.54) cas avec les IEC,
1.66 (95% CI, 1.47-1.86) cas avec les AA2
1.67 (95% CI, 1.56-1.78) cas avec les β -bloquants

Risque relatif ajusté par comparaison au β -bloquant
3.04 (95% CI, 2.81-3.27) avec les IEC,
1.16 (95% CI, 1.00-1.34) avec les AA2,

Risque d'angioedeme grave

Risque 5 fois plus élevé avec IEC vs AA2

Incidence des angioedemes graves pour 1000 patients/année

0,43 (95% CI : 0,39-0,48) cas avec les IEC

0,06 (95% CI : 0,03-0,11) cas avec les AA2

0,09 (95% CI : 0,07-0,12) cas avec les β -bloquants

Risque relatif ajusté par comparaison au β -bloquant

4,91 (95% CI : 3,62-6,65) avec les IEC

0,56 (95% CI : 0,28-1,14) avec les AA2

Usage des anti-hypertenseurs en 2019

Utilisation des AA2

Enquête FLAHS 2019- French League Against Hypertension Survey

3171 médicaments antihypertenseurs

2108 traités par antihypertenseurs

Base de 739 patients traités par AA2

www.comitehta.org

35,1% des ordonnances
24,2% des prescriptions

Usage des anti-hypertenseurs en 2019

Utilisation des bêta-bloquants

Enquête FLAHS 2019- French League Against Hypertension Survey
3171 médicaments antihypertenseurs
2108 traités par antihypertenseurs
Base de 666 patients traités par bêta bloquants

Usage des anti-hypertenseurs en 2019

Utilisation des Antagonistes Calciques

Enquête FLAHS 2019- French League Against Hypertension Survey
3171 médicaments antihypertenseurs
2108 traités par antihypertenseurs
Base de 677 patients traités par antagoniste calcique
www.comitehta.org

30,8% des ordonnances
21,4% des prescriptions

Usage des anti-hypertenseurs en 2019

Utilisation des combinaisons fixes

Enquête FLAHS 2019- French League Against Hypertension Survey

3171 médicaments antihypertenseurs

2108 traités par antihypertenseurs

Base de 681 patients traités par combinaison fixe

32,3% des ordonnances

Effet d'une restriction sodée de 5 g sur la PAS/PAD

Une revue COCHRANE basée sur une recherche bibliographique allant de 1966 à 2002

	Normotendu	Hypertendu
PAS	-1,27 (-1,76 à -0,77)	-4,18 (-5,08 à - 3,27)
PAD	- 0,54 (-0,94 à -0,14)	-1,98 (-2,46 à -1,32)

La consommation de sel évaluée sur la natriurèse des 24 heures chez l'hypertendu suivi dans une consultation hospitalière d'Ile-de-France

L'effet sur la pression artérielle systolique de la restriction sodée est rapide

DAHS Hypertension. 2003;42:459-467.

Activité physique et hypertension

Résultats issus de 7 études d'intervention sur le mode de vie pour un total de 1117 patients

Cas cliniques

Homme, 42 ans, traité depuis 6 mois

- Visite de suivi
- Aucune plainte ni symptôme
- Traitement : irbesartan 150 1 cp le matin
- Bilan sanguin normal il y a 6 mois

Homme, 42 ans, traité depuis 6 mois

ÉVALUATION DE L'OBSERVANCE D'UN TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX

Respect du traitement prescrit : où en est votre patient ?

	Oui	Non
Ce matin avez-vous oublié de prendre votre traitement ?	☒	☐
Depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne de médicament ?	☐	☒
Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l'heure habituelle ?	☒	☐
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, votre mémoire vous fait défaut ?	☐	☒
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ?	☐	☒
Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ?	☐	☒

Girerd X, et al. Évaluation de l'observance par l'interrogatoire au cours du suivi des hypertendus dans des consultations spécialisées - Arch Mal Coeur Vaiss. 2001 Aug ; 94 (8) : 839-42

Comment évaluer le niveau d'observance de votre patient ?

Votre patient répond par oui ou par non à chacune de ces 6 questions.

- Si votre patient répond non à toutes les questions, il est considéré comme un bon observant.
- Si votre patient répond oui une ou deux fois, il est considéré comme non observant mineur.
- Si votre patient répond oui trois fois ou plus, il est considéré comme non observant.

Ce questionnaire est également disponible sur www.ameli.fr espace Professionnels de santé-Médecins, rubrique Exercer au quotidien>Prescriptions-La prescription de médicaments.

<https://www.ameli.fr/content/evaluation-de-lobservance-dun-traitement-medicamenteux>

Femme, 77 ans, arrivée en France depuis 3 mois

- Visite à la sortie du service de cardiologie
- diabétique en surpoids, HTA ancienne traitée par la médecine locale (Cameroun)
- OAP flash hypertensif avec bilan cardiaque montrant une cardiopathie hypertensive sévère
- Etiologie de l'HTA : insuffisance rénale DFG 35 ml/min sans autre anomalie, K 4,6
- LASILIX 40 mg : un comprimé matin, et midi
- RAMIPRIL 2,5 : un comprimé matin et soir
- AMLODIPINE 10 mg : un comprimé le soir

Bilan clinique

- PA/FC: 142/80/70 à la mesure 3 assis 150/100/75 en position debout
- Surveillance de la fonction rénale et de la kaliémie
- Poids stable

Projet Patient

- Eviter la consommation excessive de sel : retirer le Kubor® des recettes traditionnelles
- Pesée quotidienne avec « journal de bord » et appel IPA si le poids augmente de +3 kg
- Achat d'un tensiomètre automatique (avec brassard au bras 22-42 cm, Hartman ou OMRON)
- Revoir après l'achat du tensiomètre : éducation à l'ATM

Décision

- Confirmation de la prescription actuelle sans modification et importance de l'observance
- Inscription à un programme télésurveillance
- Suivi coordonné avec le cardiologue et le MG

Homme, 60 ans, suivi cardiologique depuis 8 ans pour arythmie

- ACFA traitée par CEE, 6 mois par Eliquis puis arrêt
- hypertension artérielle, dyslipémie, surpoids actuellement en diminution à 107 kg, diabète type 2 traité depuis 2 ans par Metformine.
- Le patient va bien sur le plan cardiovasculaire avec quelques palpitations brèves peu fréquentes souvent le matin. Pas de malaise lipothymique ni perte de connaissance. Pas de douleur thoracique. Activité physique peu fréquente car dyspnée d'effort et arthrose du genou gauche (lésion ligamentaire à l'âge de 30 ans).
- Le traitement COVERSYL : 10 mg x 1, CARDENSIEL : 5 mg x 1, Kaleorid 6 cp par jour
- Le patient n'a plus de médecin traitant depuis son déménagement.

Bilan clinique

- L'électrocardiogramme ce jour s'inscrit en rythme sinusal à 62/min avec quelques ESA et onde T plates.
- L'examen clinique est sans particularité,
- pression artérielle
 - 152/104 Mesure 1
 - 136/100 Mesure 3
 - 140/110 position debout.

Observance du traitement

ÉVALUATION DE L'OBSERVANCE D'UN TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX

Respect du traitement prescrit : où en est votre patient ?

	Oui	Non
Ce matin avez-vous oublié de prendre votre traitement ?	☐	☒
Depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne de médicament ?	☐	☒
Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l'heure habituelle ?	☐	☒
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, votre mémoire vous fait défaut ?	☐	☒
Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ?	☐	☒
Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ?	☒	☐

Décision

- Suspecter une HTA surrénale
- Orienter le patient vers un spécialiste de l'HTA
- Pas de changement du traitement
- Conseil d'achat d'un tensiomètre au bras
- Bilan biologique en externe (kaliémie, créatininémie, HbA1c, EAL)

Homme, 72 ans, traité depuis 24 mois

- Aucune plainte, dyspnée d'effort
- suiviHTA moyenne SYS 142 DIA 72
- Bonne observance
- Traitement : ramipril 2,5 1cp le matin

renouvellement sans avis médical
OUI ou NON

Homme, 72 ans, traité depuis 24 mois

- Aucune plainte, dyspnée d'effort
- suiviHTA moyenne SYS 142 DIA 72
- Bonne observance
- Traitement : ramipril 2,5 1cp le matin

**NON pas de renouvellement
prendre un avis médical**

Homme, 82 ans, traité depuis 20 ans

- Arthrose cervicale, acouphènes
- suivi HTA non réalisé SYS 142 DIA 64 (consultation)
- Bonne observance
- Bilan biologique récent dans les normes
- Traitement : Coveram 5/5 1cp le matin, Kardegic 75, atorvastatine 10 mg,

renouvellement sans avis médical

OUI ou NON

Homme, 72 ans, traité depuis 24 mois

- Aucune plainte, dyspnée d'effort
- suiviHTA moyenne SYS 142 DIA 72
- Bonne observance
- Traitement : Coveram 5/5 1cp le matin, Kardegic 75, atorvastatine 10 mg,

**OUI : renouvellement sans avis
médical**

Education à l'usage de suiviHTA

**Savoir prendre en charge
l'HTA sévère**

Pour le spécialiste, la prise en charge de l'HTA résistante est standardisée

RECOMMANDATION

PRISE EN CHARGE DE L'HTA RÉSISTANTE

Groupe de travail
Thierry Danzolle, Bernard Chamontin, Gérard Doll, Jean-Pierre Fauret, Xavier Girerd,
Daniel Harpin, Bernard Vaisse, Frédéric Villeneuve
au nom de la Société Française d'Hypertension Artérielle.

La spironolactone 25 mg/j doit être ajoutée préférentiellement à la trithérapie AA2/IEC + antagoniste calcique + diurétique thiazidique dans l'HTA non contrôlée

L'intensité de la baisse de la PA avec la spironolactone est plus importante si la rénine est basse

La probabilité d'obtenir la meilleure baisse de la PA avec le bisoprolol est plus importante si la rénine est très haute

YouTube « Hypertension France » et Fondation Hypertension www.frhta.org

LA FONDATION

Hypertension secondaire : quel bilan en 2023 ?

A l'occasion des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie en janvier 2023 à Paris, le Dr François Silhol (Marseille) et le Pr Xavier Girerd échantent sur leurs pratiques actuelles pour les bilans à effectuer pour rechercher une hypertension secondaire. Une vidéo sans langue de bois avec des experts qui sont en accord !

Le TDM de la région rénale et surrénale permet le bilan des HTA secondaires

Parenchyme rénal

Morphologie surrénale

Artère rénale

Bilan par TDM chez l'hypertendu suspect d'une HTA surrénale

Population totale (n=69)	
Patients Non contrôlés	51 (76%)
Kaliémie $\leq 3,7$ mmol/l	24 (36%)
Âge moyen au diagnostic HTA	40,5 +/- 13,8
Âge moyen en HDJ	49,8 +/- 15,5
Prévention primaire	59 (85%)

Anomalies TDM